

Vågehval *Balaenoptera acutorostrata*



Sildreki Tikaagullik Hrefna Vågehval Vuotnabossu Minke whale



Vågehval stikker hovedet op over vandet i det stille blå hav, Bjørnøya
© George McCallum / Institute of Marine Research of Norway

Den almindelige vågehval er den mest udbredte **bardehval** og findes i alle havbassiner. Det er den mindste og en af de mest strømlinede **bardehvalarter** i Nordatlanten. Deres lille størrelse og hurtighed gjorde, at vågehvaler ikke var genstand for voldsom jagt i den **industrielle hvalfangsts** tid. I dag er vågehvalen den mest jagede store hvalart i Nordatlanten, da den er en fødevareresource for mange mennesker. **Bestandene** er dog ikke truede.

Udvokset længde 9 meter
Udvokset vægt 9,000 kg
Maksimal alder 60 år
Spiser krill og stimefisk
Gruppestørrelse oftest alene i Nordatlanten

Rovdyr spækhugger
IUCN-status livskraftig (2022)
Forekomst i Nordatlanten >180,000
Jaget i
Gennemsnit 2019-2023 20 hvaler/år
 9 hvaler/år
 513 hvaler/år

Trusler:



Klimaforandringer



Jagt

Vågehval *Balaenoptera acutorostrata*



Sildreki Tikaagullik Hrefna Vågehval Vuotnabossu Minke whale

Vågehvaler spiller en afgørende rolle i havets **økosystemer**, især i det nordøstlige og centrale Atlanterhav. De sluger over 1,8 millioner tons **bytte** hvert år, herunder fisk som sild, torsk og kuller, som er vigtige handelsvarer for os mennesker. I islandske farvande alene spiser vågehvaler omkring 1 million tons fisk årligt. Undersøgelser tyder på, at disse fødevaner kan påvirke fiskernes fangst, men hvor stor en betydning, det har, er man stadig i gang med at undersøge. Overraskende nok ser det ud til, at vågehvalens jagt på lodde – en fisk, som er en vigtig del af dens kost – øger mængden af lodde, fordi det holder torskebestandene nede.

Et usædvanligt syn: to vågehvaler ud for Norges kyst. Vågehvaler ses oftest alene i det nordøstlige Atlanterhav © Kjell Arne Fagerheim / Institute of Marine Research of Norway



Vågehval bryder havoverfladen © Marine and Freshwater Research Institute, Iceland

Der er to anerkendte **arter** af vågehval: den almindelige vågehval og den antarktiske vågehval (der kun lever på den sydlige halvkugle). Der er tre **underarter** af den almindelige vågehval: den nordatlantiske, den nordpacificke og dværgvågehvalen. Vågehvaler på den nordlige halvkugle er lette at kende på det karakteristiske hvide bånd på deres **luffer**.



Forskning: Hvordan **vandrer** den almindelige vågehval over Nordatlanten, og hvilke forskningsundersøgelser er i gang for at lære mere om dette?